

## ŚWIADOMA ZGODA NA WYKONANIE ZABIEGU MANOMETRII ANOREKTUALNEJ

Zielona Góra, dnia .....

Nazwisko i imię chorego/chorej .....

Data urodzenia .....

**Manometria anorektualna** to nowoczesna metoda diagnostyczna polegająca na pomiarze ciśnień w strefia zwieraczy odbytu i odbytnicy. Badanie umożliwia ocenę spoczynkowej i skurczowej czynności zwieraczy odbytu oraz koordynacji podczas próby parcia, a także ocenę progów uczucia w zakresie odbytnicy (przy użyciu sondy z balonem, który stopniowo wypełnia się powietrzem lub wodą). Wyniki pomiarów są rejestrowane i analizowane komputerowo. Możliwa jest ocena czucia trzewnego oraz przeprowadzenie prób czynnościowych odbytu i odbytnicy.

**Wskazania:** Manometria anorektualna znajduje zastosowania m.in. w diagnostyce nietrzymania stolca, przewlekłych zaparć, przy podejrzeniu schorzeń wymagających leczenia chirurgicznego (wady wrodzone odbytu i odbytnicy, Choroba Hirschsprunga, zabiegi proktologiczne i onkologiczne) oraz w ocenie stanów pooperacyjnych (m.in.: po operacjach guzków krwawniczych i przetok około odbytnicznych). Pomiar manometryczny wykorzystuje się także w treningu biofeedback w nieoperacyjnym leczeniu nietrzymania i dyssynergii zwieraczy odbytu.

**Manometria odbytu i odbytnicy trwa około 30 minut w pozycji ginekologicznej i jest bezbolesna.** Lekarz wprowadza przez odbyt niewielki cewnik z balonikiem połączony z urządzeniem rejestrującym zmiany ciśnienia i siłę skurczu mięśni. Tej fazy badania może towarzyszyć lekki dyskomfort. Następnie osoba przeprowadzająca badanie może prosić pacjenta o wykonanie próby zaciśnięcia zwieraczy, rozluźnienia ich, próby parcia na stolec (wydalenia cewnika). W trakcie manometrii balonik na cewniku kilkakrotnie wypełniany jest powietrzem, aby obserwować odruchy ścian jelita oraz rejestrować obecne ciśnienie w końcowym odcinku przewodu pokarmowego. Pacjent pytany jest również o swoje odczucia w trakcie przeprowadzania badania (np. uczucie parcia na stolec, pełności jelit).

**Jak przygotować się do manometrii odbytu i odbytnicy?** Przed wykonaniem manometrii odbytu i odbytnicy można stosować codzienną dietę. Spożywanie posiłku w dzień badania nie powinno wpłynąć na jego wyniki, zalecane jest jednak powstrzymanie się od jedzenia i picia 3-4 godziny przed badaniem. Konieczne jest opróżnienie jelit przed wprowadzeniem cewnika, dlatego pacjent proszony jest o wcześniejsze oddanie stolca i wykonanie na 2-3 godziny przed badaniem doodbytnicznej wlewki czyszczącej (lewatywy). W przypadku stosowania leków działających skurczowo i rozkurczowo na mięśnie, badany proszony jest o ich tymczasowe odstawienie, gdyż mogłoby to zafałszować wyniki badania.

**Jakie są przeciwwskazania do manometrii odbytu i odbytnicy?** W przypadku uczulenia na lateks należy poinformować o tym lekarza - wykorzystane zostaną wtedy sonda i balonik niezawierające tej substancji.

**Jakie powikłania mogą wystąpić po wykonaniu manometrii odbytu i odbytnicy? Jak postępować po badaniu?** Manometria odbytu i odbytnicy to badanie bezpieczne i zwykle dobrze tolerowane przez pacjentów. Bardzo rzadkie powikłania manometrii odbytu i odbytnicy to ból w okolicy odbytu, wyjątkowo rzadko może wystąpić krwawienie i perforacja odbytnicy.

.....  
Podpis lekarza.....  
Podpis pacjenta/pacjentki/opiekuna

### Przetwarzanie danych osobowych RODO

- Administratorem danych osobowych jest firma SCM UROLOG Sp.j.
- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w *sprawie swobodnego przepływu takich danych*, krajowymi przepisami wykonawczymi do ww. rozporządzenia oraz przepisami dotyczącymi przetwarzania dokumentacji medycznej.
- Wyrażenie zgody jest niezbędne w celu wykonania świadczenia zdrowotnego przez SCM UROLOG Sp.j.
- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji świadczenia medycznego.
- Pani/Pana dane kontaktowe przetwarzane będą wyłącznie w związku z realizacją świadczenia medycznego.

Zielona Góra ..... 2023 r.

.....  
Podpis pacjenta